MS Schippers

22 KG

0601156

NETTOLIJE GEBRUIKSVOORSCHRIFT (NL)
Vloeistof voor desinfectie
Alleen voor professionele gebruik
Andere voor gebruik, bijende of schadelijke stoffen: Methanol
Pas op: het product is ontvlambaar. Met weer meegbar concentratie
Bevat: Methanol

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Le produit est exclusivement destiné à un usage professionnel.

Gebruik
MS Formades is een middel voor de bestrijding van bacterien (incl. mycobacterien, maar excl. bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen door middel van verneveren in dwarsmistjoldoosen met een maximale inhoud van 500 ml, afhankelijk van de ruimtegrootte.
MS Formades is een middel voor de bestrijding van bacterien (incl. mycobacterien, maar excl. bacteriesporen) zo hoven van ruimten en schapen door middel van toefvlakken.

Ruimte behandeling
Voorbereiding
Ramen, deuren, ventilatiekanalen, openstelsel en apparatuur eerst grondig reinigen. Een daarna gebruikte reinigingsmiddel weggoomen met schone water. Overtollig water verwijderen. Wanneer dit niet kunnen lukken met waar of drinkwater wordt dieren na behandeling grondig afspoelen met schoon water.

Toepassing
Algemene instructies voor verneveren:
- Verneveren van de ruimte dient plaats te vinden bouwen 15°C, indien nodig de ruimte eerst verwarmen.
- Verdeelen van de betreffende ruimte zodatten en ventilatieopeningen dichtmaken.
- Droog de volgende personelijke beschermingsmiddelen: adembescherming (B2 gisch), handschoenen en beschermende kleding.
- Vul gedeelte aquaroluur met de juiste hoeveelheid middel, zet de aquaroluur aan en verlaat direct de ruimte.
- Sluit de deur van de ruimte de ruimte gedurende 24 uur gesloten.
- Verneven de ruimte tot boven 15°C, verdeel de vedelingen van de ruimte totdat de ruimte verlaag droog is.
- Wanneer de behandelde ruimte bereiden moet worden voor eventuele tussentijdse bemonstering, moeten doelbiffe personelijke beschermingsmiddelen als hierboven voorgeschreven gebruiken worden.
- Voor bemonstering worden Drager adsorptiebuizes, meetbereik 0,2 – 2,5 mg/m3 gebruiken.
- Voor bemonstering van de lucht in de ruimte worden Drager adsorptiebuizes de bemonstering/desinfectiegebieden voor formaldehyde gebruiken (MAC-TGG 15 minuten: 0,37 mg/m3, 0,5 mg/m3, MAC-TGG 8 uur: 0,15 mg/m3).

Dosering
Eenmaldijkuiven en bijbehorende stallen en materialen (machines en gereedschappen) moeten grondig worden gereinigd. Vervolgens dient de ruimte te worden ontsmet. Dit kan door middel van verneven van de ruimte van de ruimte van de ruimte, dieren, gereedschappen en consumptiewater beste.

Hoeflaken
Plaats een schone bak, volume tot 500 l, eventueel voorzien van een voetemmel, zodanig, dat het wie er kunnen worden gelegd. Vul de bak met de juiste hoeveelheid MS Formades (1,3 tot 2,5 liter per m² oppervlak) middel tot 100 liter water, gebruik gedeelde maatbeker (of zuur, na het vullen van de bak. Frequentie bij routinematig gebruik, videre 2 à 3 weken hanthaken. Bij vuil dan bijbehoeding 1 à 2 keer per week.

Het middel niet in direct contact met dieren laten komen, met uitzondering van de hoven.

N.B.: Het middel wordt onwerksoaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen en wanneer het verouderd is met organisch materiaal.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT (NL)
Toegepaste is uitsluitend het gebruik van middel ter bestrijding van bacterien (incl. mycobacterien, maar excl. bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen.
- Het middel niet verwarmen, niet bechemen en in gebruiksaanwijzing, in:
- Ramen, deuren, ventilatiekanalen, openstelsel en apparatuur eerst grondig reinigen en zodatten.
- A. Wanneer bijbehoeven niet rugdelenmde zaden en materialen (machines en gereedschappen) en als middel ter bestrijding van bacterien (incl. mycobacterien, maar excl. bacteriesporen) van de ruimte van de ruimte van de ruimte van de ruimte van de ruimte.
De dieren mogen niet aanwezig zijn in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden. De desinfecte moet worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing. Verneveren van het middel is niet toegestaan in aanwezigheid van dieren. Het middel niet verwarmen, niet bechemen en in gebruiksaanwijzing, in: - Het direct contact met dieren laten komen, met uitzondering van de hoven. Om vermeidend functioneren van een individuele behandeling Afvalwater (Bij) te voorkomen, dienen afvalvoeten die het middel bevatten, eerst te worden verwarmd tot boven 15°C, verdeel de vedelingen van de ruimte totdat de ruimte droog is. Bestemd voor professioneel gebruik. Desinfecte door middel van verneveren nag, uitsluitend worden uitgevoerd door professionals, die een opleiding voor ruimtedesinfecte hebben gevolgd.

ANTIDOTEN/ANTIDOTA
- Gesinthetiste uitsluitend middel ter bestrijding van bacterien (incl. mycobacterien, maar excl. bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen door middel van verneveren in dwarsmistjoldoosen met een maximale inhoud van 500 ml, afhankelijk van de ruimtegrootte.
MS Formades is een middel voor de bestrijding van bacterien (incl. mycobacterien, maar excl. bacteriesporen) zo hoven van ruimten en schapen door middel van toefvlakken.

Ruimte behandeling
Voorbereiding
Ramen, deuren, ventilatiekanalen, openstelsel en apparatuur eerst grondig reinigen. Een daarna gebruikte reinigingsmiddel weggoomen met schone water. Overtollig water verwijderen. Wanneer dit niet kunnen lukken met waar of drinkwater wordt dieren na behandeling grondig afspoelen met schoon water.

Toepassing
Algemene instructies voor verneveren:
- Verneven van de ruimte dient plaats te vinden bouwen 15°C, indien nodig de ruimte eerst verwarmen.
- Verdeelen van de betreffende ruimte zodatten en ventilatieopeningen dichtmaken.
- Droog de volgende personelijke beschermingsmiddelen: adembescherming (B2 gisch), handschoenen en beschermende kleding.
- Vul gedeelte aquaroluur met de juiste hoeveelheid middel, zet de aquaroluur aan en verlaat direct de ruimte.
- Sluit de deur van de ruimte de ruimte gedurende 24 uur gesloten.
- Verneven de ruimte tot boven 15°C, verdeel de vedelingen van de ruimte totdat de ruimte volledig droog is.
- Wanneer de behandelde ruimte bereiden moet worden voor eventuele tussentijdse bemonstering, moeten doelbiffe personelijke beschermingsmiddelen als hierboven voorgeschreven gebruiken worden.
- Voor bemonstering worden Drager adsorptiebuizes, meetbereik 0,2 – 2,5 mg/m3 gebruiken.
- Voor bemonstering van de lucht in de ruimte worden Drager adsorptiebuizes de bemonstering/desinfectiegebieden voor formaldehyde gebruiken (MAC-TGG 15 minuten: 0,37 mg/m3, 0,5 mg/m3, MAC-TGG 8 uur: 0,15 mg/m3).

Dosering
Eenmaldijkuiven en bijbehorende stallen en materialen (machines en gereedschappen) moeten grondig worden gereinigd. Vervolgens dient de ruimte te worden ontsmet. Dit kan door middel van verneven van de ruimte van de ruimte van de ruimte, dieren, gereedschappen en consumptiewater beste.

Hoeflaken
Plaats een schone bak, volume tot 500 l, eventueel voorzien van een voetemmel, zodanig, dat het wie er kunnen worden gelegd. Vul de bak met de juiste hoeveelheid MS Formades (1,3 tot 2,5 liter per m² oppervlak) middel tot 100 liter water, gebruik gedeelde maatbeker (of zuur, na het vullen van de bak. Frequentie bij routinematig gebruik, videre 2 à 3 weken hanthaken. Bij vuil dan bijbehoeding 1 à 2 keer per week.

Het middel niet in direct contact met dieren laten komen, met uitzondering van de hoven.

N.B.: Het middel wordt onwerksoaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen en wanneer het verouderd is met organisch materiaal.

UTILISATION (DELIFE)
Liquide de désinfection
Usage professionnel
Autres: Attention à ne toxique(s), corrosive(s) et dangereuse(s) : Méthanol
Tenir à la température : Concentré mécidée à l'eau
Produit : Pour
MS Formades est un produit de lutte contre les bactéries (incl. mycobactéries mais pas les spores bactériennes), levures, moisissures et virus par pulvérisation dans des boîtes de brume de 500 ml, selon la taille de la pièce.
MS Formades est un produit de lutte contre les bactéries (incl. mycobactéries mais pas les spores bactériennes) dans les étables hoves et sens, par le bain du bam de sabots.

Centre Antipoisons: 0032 (0)70-245245

Traitement de l'espace
Préparation
Nettoyer, rincer temps, retirer en profondeur les ouvrages, surfaces et appareils à désinfecter. Rincer le détergent utilisé à l'eau. Enlever de réparate une quantité trop importante d'eau.

À l'issue du traitement, rincer soigneusement à l'eau claire les matériaux susceptibles d'entrer en contact avec le nourriture ou l'eau des animaux.

Application
Respecter les prescriptions de vaporisation:
- Pulvériser le bâtiment à une température supérieure à 15 °C, chauffer, le cas échéant, le bâtiment au préalable si nécessaire.
- Protéger la ventilation de l'espace concerné et boucher les ouvertures de ventilation.
- Porter les équipements de protection individuelle suivants: protection respiratoire (B2 gris), gants et une combinaison formant bain.
- Remplir le réservoir du pulvérisateur de la bonne quantité de produit, mettre l'appareil en marche et quitter immédiatement l'espace.
- Maintenir l'espace fermé pendant 24 heures.
- Pulvériser à nouveau à une température de 15 °C. Répéter les vapeurs résiduelles en ventilant jusqu'à ce que la pièce soit complètement sèche.
- Si un accès à l'espace traité est requis pour un échantillonnage intermédiaire, porter les mêmes équipements de protection individuelle que ceux prescrits ci-dessus.
- Pour l'échantillonnage, les tubes d'absorption Drager, plage de mesure 0,2 – 2,5 mg/m3, sont recommandés.
- Pour contrôler la teneur en air d'une étable à l'espace, les limites d'exposition professionnelles pour le formaldéhyde s'appliquent (MAC-TGG 15 minutes: 0,37 mg/m3, 0,5 mg/m3, MAC-TGG 8 uur: 0,15 mg/m3).

Dosage
Les bacs de trépas des animaux ainsi que les étables et materiaux (machines et outils) associés, doivent être nettoyés. Ensuite le produit à 2% (0,8 à 1,100 ml). La pulvérisation du produit est interdite dans les espaces où des personnes, des animaux, des plantes ornementales et de consommation sont présents.

Bains de sabots
Placer un bac de trépas, volume jusqu'à 500 l, éventuellement pourvu d'un tapis, de manière à ce que le bison puisse le traverser. Remplir le bac jusqu'à ajouter le produit.

Dosage
Concentration: 4 % (4 litres de produit dans 100 litres d'eau).
utilisation: pendant 24 heures maximum, après remplissage du bac.
Fréquence: en cas d'utilisation régulière: toutes les 2 à 3 semaines. En cas de traitement ad hoc, 1 à 2 fois par semaine.
Ne pas laisser le produit entrer directement en contact avec les animaux, à l'exception des sabots.

N.B.: Le produit devient inefficace lorsqu'il entre en contact avec du savon ou des toxines synthétiques et lorsqu'il est pollué par des matières organiques. Décharge de résidus de bains de sabots ou de produits de pulvérisation: Les résidus de bains de sabots et des autoclaves. Les résidus doivent être détruits par le fournisseur de la société.
Remplissage des bains de sabot et/ou autoclaves: Ne pas laisser de sabot avec une capacité> 500L

LEVNÅRSIGNE FORSKRIFTER FOR BRUG (DK)
Type af middel: Koncentrat der kan blandes med vand.
Anvendelse: Kun til professionel brug.
Andre farer: Indeholder methanol, ikke andre skadelige stoffer: Methanol
Sørg for ikke-brug af biocider: Lad ikke efterlades og produktbeholdere for brug.

Det er kun tilladt at anvende middel til bekæmpelse af bakterier (inkl. mykobakterier, men ikke. bakteriesporer), gærsvampe, svampe og virus i dispensere.
1. med at anvende forsigtighed
A. Lomme bluser beregnet til at dyre frugt og grønsager, pryldæmper og chemigrones m.v.
B. Ved anvendelse af dispensere i dyrestalde og produktion/opbevaring uyn middel til bekæmpelse af bakterier (inkl. mykobakterier, men ikke. bakteriesporer).
2. gå bæer og fliks klove ved hjælp af klorkalk.
Dosering: 4% (4 liter produkt i 100 liter vand). Anvendelsesmåde: Nye. Desinfektionen skal udføres som angivet: Forgængelsesmåde: Forbrænding af middel er ikke tilladt i uvn hvor der opholder sig mennesker; dyr. pryldæmper egnede frugt og grønsager. Middel mål ikke komme i direkte kontakt med dyr, med undtagelse af hoven. Det er ikke tilladt at anvende produktet i nærværelse af mennesker, dyr, afskældsoffer; der indehæver produkt udledes til grundvand og/eller eller via det kommunale kloksystem. Middel er udskillelende bemærket til professionel brug. Desinfektion skal brug af forbrænding. Det er ikke tilladt at anvende produktet i nærværelse af.

MEDGIVELSESMÅDE
Produktet er udelukket kun til professionel brug.
Produktet er udelukket til professionel brug. Ved brug af bærer-sprøjtemidler, fødegrænsefaktor, der anvendes hånd skulle produkt sæb med rent vand. Overskydende vand fjernes. Materialer der kan komme i kontakt med produkt skal dyrebare eller tilstrækkelig lige. Ud. Udgiv. Produkt med rent vand eller desinfektionsmidler.

Generelle anvisninger for forstærkning:
- Lille behandlingen ved en temperatur over 15°C, om nødvendig opvarmes rummet først.
- Sluk for ventilationen af det pågældende rum og luk ventilationsåbningerne.
- Fordel de pågældende rum og ventilationskanaler. Anbefalet mærkning (B) gulv, handsker og en beskyttelse tøj.
- Fyld det egnede udstyr med den korrekte mængde middel, tænd for udstyret og forlad straks rummet.
- Rummet skal hverfter holdes lukket de følgende 24 timer.
- Opvarm rummet til over 15°C, de resterende dampe verdrivers ud af rummet, indtil rummet er helt tørt.
- Hvis der er nødvendigt at tomtale rummet for eventuel analysering af prøver, skal der overholdes personlige beskyttelsesmidler.
- Til prøvetagning er Drager-rørene egnede.
- Vi anbefaler Drägerrør, målområde 0,2 – 2,5 mg/m3 til prøvetagning.
- Til kontrol af luftkvalitet i en stald er den tilladelige koncentration af rummet dyre-and-dang eksponering for formaldehyd i arbejdsplatser.
(Grænseværdi for eksponering (15 minut): 0,3 mg/m3, Grænseværdi for eksponering: 8 timer: 0,15 mg/m3)

14. Tomme tekster beregnet til at dyrke frugt og grønsager, pryldæmper og chemigrones m.v.
Dosering: 2% (2 liter produkt i 100 liter vand). Anvendt: 5 ml/ 6 liter opskering. pH: 100 ml/ 6 liter.
15. Lukke med tilstrækelig rum og materialer (maskiner og redskaber).
Dosering: «Forynde middel. 1,3 til 2,5 liter middel pr. 100 m2. Ser er også mulig at anvende produkter forhynder i vand. Her anvendes en tilsvarende mængde NS Formades (1,3 til 2,5 liter pr.kvadratmeter pr. 100 m2).

2. Desinfektionsmidler til kloakrør
Dosering: Ved anvendelse af produktet i kloakrørene skal brugs og fjr. Klovene der skal desinficeres skal bæer rengøres grundigt med rent vand. Skal der ikke ske kontakt med dyr, eventuelt under med rent vand. Det er ikke tilladt at anvende produktet forbrænding. Det er ikke tilladt at anvende produktet i nærværelse af mennesker, dyr, afskældsoffer; der indehæver produkt udledes til grundvand og/eller eller via det kommunale kloksystem. Middel er udskillelende bemærket til professionel brug. Desinfektion skal brug af forbrænding. Det er ikke tilladt at anvende produktet i nærværelse af.

MEDGIVELSESMÅDE
Produktet er udelukket kun til professionel brug.
Produktet er udelukket til professionel brug. Ved brug af bærer-sprøjtemidler, fødegrænsefaktor, der anvendes hånd skulle produkt sæb med rent vand. Overskydende vand fjernes. Materialer der kan komme i kontakt med produkt skal dyrebare eller tilstrækkelig lige. Ud. Udgiv. Produkt med rent vand eller desinfektionsmidler.

Generelle anvisninger for forstærkning:
- Lille behandlingen ved en temperatur over 15°C, om nødvendig opvarmes rummet først.
- Sluk for ventilationen af det pågældende rum og luk ventilationsåbningerne.
- Fordel de pågældende rum og ventilationskanaler. Anbefalet mærkning (B) gulv, handsker og en beskyttelse tøj.
- Fyld det egnede udstyr med den korrekte mængde middel, tænd for udstyret og forlad straks rummet.
- Rummet skal hverfter holdes lukket de følgende 24 timer.
- Opvarm rummet til over 15°C, de resterende dampe verdrivers ud af rummet, indtil rummet er helt tørt.
- Hvis der er nødvendigt at tomtale rummet for eventuel analysering af prøver, skal der overholdes personlige beskyttelsesmidler.
- Til prøvetagning er Drager-rørene egnede.
- Vi anbefaler Drägerrør, målområde 0,2 – 2,5 mg/m3 til prøvevask