

Insecticide with physical-mechanical action
Insecticide met fysisch-mechanische werking
Insektizid mit physikalisch-mechanischer Wirkung
Insecticide à action physico-mécanique

2309418

WARNING
WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG

EN: Hazard statements: H319 – Causes serious eye irritation. **Precautionary statements:** P280 Wear eye protection / face protection. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337+P313 If eye irritation persists: get medical advice/attention.

NL: Gevarenaanduidingen: H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **Voorzorgsmaatregelen:** P280 Draag oogbescherming/gelaatsbescherming. P305+P351+P338 Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

DE: Gefahrenhinweise: H319 - Verursacht schwere Augenreizung. **Sicherheitshinweise:** P280 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

FR: Mentions de danger: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. **Conseils de prudence :** P280 Porter un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Batch n°/manufacturing date / Batch N°/Productiedatum / Chargen-Nr./ Produktionsdatum / N° de lot/date de fabrication:



Validity: 3 years from the manufacturing date.

Geldigheid: 3 jaar vanaf productiedatum.

Gültigkeitsdauer: 3 Jahre ab Produktionsdatum.

Validité : 3 ans à compter de la date defabrication.

UFI: FTXS-R0GA-U00V-NSU8

25 LV 07

Schippers Export EU BV
 Schippers Africa BV
 Schippers APAC BV
 Schippers LATAM BV
 Schippers ME BV
 Tel: +31(0)497-339774

All located in:
 Schippers Europe BV
 Smaragdweg 60
 5527 LB Hapert
 Tel: +31(0)497-339 779

België:
 Schippers BV
 Grens 114
 2370 Arendonk (BE)
 Tel: 014-672356

Deutschland:
 Schippers GmbH
 Kölner Straße 62
 47647 Kerken (D)
 Tel: 02833-92360

France:
 Schippers France Sarl
 ZA de la Retaudais -
 CS 10009
 35137 BEDEE (FR)
 Tél: 02 99 61 40 40

Download app!
 Scan this product



2309418

EN: Instructions for Use and Dosage

Shake well before use. Dilute the product in water 1:5 and spray directly on the insects to immobilize and kill them (optimal pressure of 3 bar).

Recommended dose: 100 ml/m². Increase the dose on absorbent or very dirty surfaces. In order to obtain optimal results, remove dust and dirt before treatment. Surfaces should appear very wet immediately after application. It is recommended to reapply the product 7-10 days after the 1st application, or when the parasites reappear.

Always prepare fresh solutions and use them within 12 hours.

• Red mites:

Spray on surfaces, cracks and crevices where parasites hide or live. The application should be carried out at times of the day when animals are at rest (typically in the evening). Avoid the use of

intense lights to prevent the escape of parasites and facilitate treatment.

Do not apply directly to animals or loose feedstocks.

DO NOT APPLY DIRECTLY TO CATTLE, FOWL NOR HENS. Collect eggs, remove food and do not contaminate waters and feeders.

Do not apply to live electrical systems. Do not apply on vegetation as the product may be phytotoxic.

Use only in well-ventilated areas.

In general, the product will be effective on insects directly affected during treatments and will not leave residues.

It is always recommended to test the product on a small, inconspicuous area of the surfaces to be treated before applying the product widely, in order to preliminarily check the possible formation of stains or halos.

NL: Gebruiksaanwijzing en dosering

Goed schudden voor gebruik. Verdun het product in water 1:5 en spuit rechtstreeks op de insecten om ze te immobiliseren en te doden (optimale druk van 3 bar).

Aanbevolen dosering: 100 ml/m². Verhoog de dosering op absorberende of zeer vuile oppervlakken. Voor een optimaal resultaat stof en vuil verwijderen vóór de behandeling. Oppervlakken moeten onmiddellijk na het aanbrengen zeer nat lijken. Het wordt aanbevolen om het product 7-10 dagen na de 1e toepassing opnieuw aan te brengen, of wanneer de parasieten opnieuw verschijnen.

Maak altijd verse oplossingen en gebruik ze binnen 12 uur.

• Rode mijt:

Spray op oppervlakken, scheuren en spleten waar parasieten zich verbergen of leven. De toepassing moet worden uitgevoerd op momenten van de dag dat de dieren in rust zijn (meestal 's avonds). Vermijd het gebruik van intensieve verlichting om de voorkomen dat parasieten ontsnappen en om de behandeling te vergemakkelijken.

Niet rechtstreeks op dieren of los voedsel aanbrengen.

NIEUW RECHTSTREEKS OP VEE, KIPPEN OF PLUIMVEE AANBRENGEN. Verzamel eieren, verwijder voedsel en verontreinigende drink- en voederbakken.

Niet toepassen op onder spanning staande elektrische systemen. Niet toepassen op vegetatie omdat het product fytotoxisch kan zijn.

Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten.

In het algemeen zal het product effectief zijn op insecten die tijdens de behandeling direct worden aangetast en zal het geen residuen achterlaten.

Het wordt altijd aangeraden om het product te testen op een klein, onopvallend deel van de te behandelen oppervlakken voordat het product op grote schaal wordt toegepast, om vooraf de mogelijke vorming van vlekken of halo's te controleren.

DE: Gebrauchsanweisung und Dosierung

Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt im Verhältnis 1:5 mit Wasser verdünnen und direkt auf die Insekten sprühen, um sie ruhezustellen und zu töten (optimaler Druck 3 bar).

Empfohlene Dosis: 100 ml/m². Bei saugfähigen oder stark verschmutzten Oberflächen die Dosis erhöhen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, Staub und Schmutz vor der Behandlung entfernen. Die Oberflächen sollten unmittelbar nach dem Auftragen sehr feucht erscheinen. Es wird empfohlen, das Produkt 7-10 Tage nach der ersten Anwendung oder bei erneutem Auftreten der Parasiten erneut aufzutragen.

Bereiten Sie immer frische Lösungen vor und verwenden Sie diese innerhalb von 12 Stunden.

• Rote Milben:

Auf Oberflächen, Ritzen und Spalten sprühen, in denen sich die Parasiten verstecken oder leben. Die Anwendung sollte zu Tageszeiten erfolgen, in denen die Tiere ruhen (normalerweise abends). Vermeiden Sie die Verwendung von intensivem Licht, um das Entweichen der Parasiten zu verhindern und die Behandlung zu erleichtern.

Nicht direkt auf Tiere oder lose Futtermittel auftragen.

NICHT DIREKT AUF VIEH, GEFÜGEL ODER HÜHNER AUFTRAGEN. Eier einsammeln, Futter entfernen und Tränken und Futterautomaten nicht verunreinigen.

Nicht auf stromführende elektrische Anlagen auftragen.

Nicht auf Pflanzen auftragen, da das Produkt phytotoxisch sein kann.

Nur in gut belüfteten Bereichen anwenden.

Im Allgemeinen wirkt das Produkt auf Insekten, die bei der Behandlung direkt betroffen sind, und hinterlässt keine Rückstände.

Es wird immer empfohlen, das Produkt auf einem kleinen, unauffälligen Bereich der zu behandelnden Flächen zu testen, bevor das Produkt großflächig angewendet wird, um vorab die mögliche Bildung von Flecken oder Halos zu prüfen.

FR: Mode d'emploi et dosage

Bien agiter avant utilisation. Diluer le produit dans de l'eau 1:5 et pulvériser directement sur les insectes pour les immobiliser et les tuer (pression optimale de 3 bars).

Dose recommandée : 100 ml/m². Augmenter la dose sur les surfaces absorbantes ou très sales. Afin d'obtenir des résultats optimaux, il convient d'enlever la poussière et la saleté avant le traitement. Les surfaces doivent être très humides immédiatement après l'application. Il est recommandé de réappliquer le produit 7 à 10 jours après la première application, ou lorsque les parasites réapparaissent.

Toujours préparer des solutions fraîches et les utiliser dans les 12 heures.

• Acariens rouges :

Pulvériser sur les surfaces, les fissures et les crevasses où les parasites se cachent ou vivent. L'application doit être effectuée sur le site à des moments de la journée où les animaux sont au repos (généralement le soir). Éviter l'utilisation de lumières intenses pour empêcher la fuite des parasites et faciliter le traitement.

Ne pas appliquer directement sur les animaux ou les matières premières en vrac.

NE PAS APPLIQUER DIRECTEMENT SUR LE BÉTAIL, LA VOLAILLE OU LES POULES. Ramasser les œufs, retirer la nourriture et ne pas contaminer les abreuvoirs et les mangeoires.

Ne pas appliquer sur des systèmes électriques sous tension.

Ne pas appliquer sur la végétation car le produit peut être phytotoxique. Utiliser que dans des zones bien ventilées.

En général, le produit est efficace sur les insectes directement touchés lors des traitements et ne laisse pas de résidus sur le site.

Il est toujours recommandé de tester le produit sur une petite zone peu visible des surfaces à traiter avant de l'appliquer largement, afin de vérifier au préalable la formation éventuelle de taches ou d'auréoles.