

Aliment diététique pour veaux

Favorise la digestion du lait - Stimuleert melkvertering

Dieetvoeder voor kalveren

Boviform® plusSID

Aliment complémentaire diététique pour veaux diarrhéiques
Objectif nutritionnel particulier: Stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau afin de faciliter la digestion physiologique

Mode d'emploi: En cas de risque de troubles digestifs (diarrhée), pendant et après ceux-ci. Délayer 1 sachet de **Boviform® plusSID** dans 2 litres d'eau et ajouter 0,5 à 4 litres de lait ou de lacto-remplaceur selon les besoins du veau. Distribuer 1 sachet 2 fois par jour, pendant 2 à 3 jours.

Recommandations particulières: Avant utilisation et avant prolongation de la durée d'utilisation, il est recommandé de consulter un vétérinaire. **Boviform® plusSID** contient des bactéries lactiques revivifiables, la température du mélange ne doit pas excéder 50 °C.

L'utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée.
Composition: Dextrose; poudre de lactosérum (contenu en sucre diminué), chlorure de sodium, chlorure de potassium, flocons de banane, farine de gonflage du riz, camomille, pectine, graine d'anis, fenouil, chlorure de calcium, chlorure de magnésium.

Constituants analytiques: Protéine brute: 4,0 %; cellulose brute: 1,4 %; matières grasses brutes: 0,5 %; cendres brutes: 21,0 %; sodium: 4,4 %; potassium: 3,0 %; chlorures: 3,8 %.
Additifs par kg: Additifs nutritionnels: Vitamine A (E 672) 175 000 U.I.; vitamine E/Acétate d'alpha-tocophéyle totalement racémique (3a700): 440 mg; Additifs zootechniques: Enterococcus faecium DSM 10663 NCIMB 10415 (E 1707) (Oralin®) 1,75 x 10⁹ UFC; Additifs technologiques: propionate de sodium (E 281), Gomme guar (E 412); Bentonite (1m558i) 30 000 mg.

Conservation: Conserver au frais et au sec.

Distributeur for Benelux:

Fendigo

Av. Herrmann Debroux 17
BE-1160 Brussels
Tel.: (+32)-2-734.46.90
Fax.: (+32)-2-734.48.99
AUT: HN1016

Fendigo

5 425030 910023



Boviform® plusSID

Aanullend dieetvoeder voor kalveren met diarree

Bijzonder voedingsdoel: Stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans ter ondersteuning van de fysiologische spijsvertering

Gebruiksaanwijzing: In geval van risico van spijsverteringsstoornissen (diarree), gedurende en daarna: 1 zakje **Boviform® plusSID** in 2 liter water mengen en 0,5 tot 4 liter melk of melkvervanger bijvoegen naargelang de behoeften van het kalf. Dien één zakje 2 maal per dag toe, gedurende 2 tot 3 dagen.

Bijzondere aanbevelingen: Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. **Boviform® plusSID** bevat melkzuurvormende bacteriën; de temperatuur van het mengsel mag daarom de 50 °C niet overschrijden.

Gelijktijdig oraal gebruik met macroliden moet worden vermeden.

Samenstelling: Dextrose; Wei poeder (verminderd suiker gehalte); natrium-chloride; kalium-chloride; bananenvlokken; geblazen rijstmeel; kamille; pectine; anjís; venkel; calcium-chloride; magnesium-chloride.

Analytische bestanddelen: Ruw eiwit: 4,0 %; ruwe celstof: 1,4 %; ruw vet: 0,5 %; ruwe as: 21,0 %; natrium: 4,4 %; kalium: 3,0 %; chloride: 3,8 %.

Toevoegingsmiddelen per kg: Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A (E 672): 175.000 I.U.; vitamine E/all-rac- α -tocoferylacetaat (3a700): 440 mg; Zootechnische toevoegingsmiddelen: Enterococcus faecium DSM 10663 NCIMB 10415 (E 1707) (Oralin®) 1,75 x 10⁹ CFU; Technologische toevoegingsmiddelen: natriumpropionaat (E 281); guargom (E 412); bentonite (1m558i) 30.000 mg.

Bewaren: Koel en droog bewaren.

Manufacturer: **chevita GmbH** - Pfaffenhofen - Germany - Aut.No: oDE-BY-1-00022

À utiliser de préférence avant:

Voir au verso de la boîte.

Ten minste houdbaar tot:

Zie op de keerzijde van de doos.

Numéro de lot / Lotnummer:

C 3059 BCDEF
CNK 1594-506

Poids net / Nettogewicht:

24 x 115 g

ok
S. R. A. K. 2015
13/03/2015